

Läkemedel som bör undvikas till äldre

Denna lista omfattar läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre. Preparaten bör endast användas om det finns särskilda skäl för det. Det ska vidare finnas en välgrundad och aktuell orsak (indikation) för att använda läkemedlet och läkaren ska ha bedömt att den förväntade nyttan med läkemedlet står i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen bör också följas upp och omprövas regelbundet med täta intervaller. Kontakta förskrivande läkare för mer information.

Listan speglar indikatorn ”Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger” som ingår i rapporten Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (Socialstyrelsen 2017-6-7). Följande läkemedel ingår (april 2023):

Långverkande bensodiazepiner

Är lugnande och sömngivande läkemedel

Diazemuls
Diazepam
Nitrazepam
Stesolid

Tramadol

Mot smärta
Dolatramyl
Gemadol
Nobligan
Tiparol
Tradolan
Tramadol

Propiomazin

Används vid sömnbesvär
Propavan
Propiomazin

Kodein

Mot smärta
Altermol
Citodon
Kodein
Panocod
Paracetamol/Kodein
Treo Comp

Glibenklamid

Ett diabetesmedel
Daonil
Glibenklamid

Läkemedel med antikolinerga effekter

Används t.ex. vid urininkontinens, som lugnande medel och i vissa preparat mot smärta

Akineton
Alimemazin
Amitriptylin
Anafranil
Atarax
Atropin
Buscopan
Calma
Clozapine
Defrusitol
Ditropan
Egazil
Emselex
Fesoterodine
Froidir
Glykopyrroniumbromid
Hydroxizin
Hydroxyzine
Kentera
Ketogan
Klomipramin
Leponex
Lergigan
Levomepromazine

Läkemedel med antikolinerga effekter (forts.)

Metylskopolamin
Morfin-Skopolamin
Norflex
Norgesic
Nozinan
Oxikodon-hyoscin
Oxybutynin
Pargitan
Postafen
Proklorperazin
Prometazin
Robinul
Rybrila
Saroten
Scopoderm
Sensaval
Sialanar
Solifenacin
Spasmofen
Tavegyl
Theralen
Tolterodin
TOVIAZ
Truxal
Vesicare